

Diagnosecode  
(ICD-10)


**Meldepflichtige Diagnosecodes**

<b>Bösartige Neubildungen</b>	C81.0 – C96.9
<b>Neubildungen unsicheren/ unbekannten Verhaltens:</b>	D45 – D47.9

Für die Diagnosen D47.2, D47.7 und D47.9 sind nur Diagnosemeldungen erforderlich!

Lokalisationscode  
(ICD-O-3)

**Regel D:**




**Regel E:**

Alle Leukämien sind in der Lokalisation ICD-O3 mit **C42.1** (Knochenmark) zu verschlüsseln, mit Ausnahme des Myelosarkoms (9930/3).

**Achtung:** Die Lokalisation des Myelosarkoms kann auch C42.1 sein, muss aber nicht!

**!** Bei den Systemerkrankungen sind die Codes für die ICD-10-Diagnosen und ICD-O-3 Lokalisation nie identisch!

Muster  
Histologiecodes  
(ICD-O-3)




Nicht relevante  
Angaben

- TNM
- Grading
- Entnommene und untersuchte Lymphknoten
- Seitenlokalisierung (T = trifft nicht zu)

**Klassifikationen**

- **Ann Arbor** für Hodgkin und Non-Hodgkin-Lymphome
- **FLIPI** für folliculäre Lymphome
- **IPI** für aggressive Lymphome
- **MIPI** für Mantelzelllymphome
- **ELN-Klassifikation** für die AML
- **Binet-Klassifikation** für die CLL
- **EUTOS** für die CML
- **IPSS** für myelodysplastische Syndrome
- **ISS** für Plasmozytom und bösartige Plasmazellneubildungen
- **Sanz-Score** für die Promyelozytenleukämie
- **ISSWM** für Waldenström Makroglobulinämie

**Mehrfach-meldungen**



**Nicht meldepflichtige Therapien**

- Supportive Therapien, wie z.B.:
  - Immunglobulinsubstitution
  - GvHD-Prophylaxe
  - Spenderlymphozytengabe
  - Erythropoetin
  - Deferasirox
  - Erythrozyten-Konzentrate
- Nichttumorbezogene Operationen, wie z.B.:
  - Port-Implantationen